

インフルエンザ 予防内服 (院内標準)

こんな方が対象です

- ご家族や職場でインフルエンザにかかった方と接した
- 基礎疾患がある、ご高齢などで重症化のリスクが高い

※1歳以上の方が対象です。

費用

9,000円

(診察料込・自費・税込)

お薬と飲み方

■ 薬：オセルタミビル（タミフル）

■ 開始：接触後 48 時間以内

■ 期間：7～10 日間

(同居家族の発症が続く場合10日を推奨)

△ 特にご注意ください

- 腎機能が低下している方、妊娠・授乳中の方は必ずお申し出ください。
- 予防内服中に発熱・症状が出たら、すぐに受診してください（治療薬へ切り替えます）。
- 小児の場合、まれに神経精神症状が報告されています。帰宅後も様子を注意深く観察してください。

Q&A

Q1. いつ飲み始めればいい？

A. 接触後48時間以内が目安です。

Q3. 飲んでも感染しますか？

A. リスクは下がりますがゼロではありません。症状が出たらすぐ受診してください。

Q5. 副作用は？

A. 吐き気、腹痛など。まれに神経精神症状も報告されています。異常時は服用を中止し連絡してください。

Q2. 何日飲みますか？

A. 7～10日間です（同居の発症が続く時は10日を推奨）。

Q4. 子どもも飲めますか？

A. 1歳以上は体重に合わせて処方できます。